

化学療法プロトコール

申請日： 平成 31年1月11日 申請医師： 石黒 保直
 診療科： 外科 癌腫： 乳がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040147	レジメン名： PTX療法(12週投与)
1コース期間	15週	総コース数

備考：

・0.22 μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与(DEHPフリー)。・患者のアルコール過敏の有無を確認(パクリタキセル)。・投与中の過敏症反応の有無を確認。・2コース目以降の神経障害の評価をする。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パクリタキセル	80 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15, day22, day29, day36, day43, day50, day57, day64, day71, day78

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホーラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 80 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day8 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホーラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 80 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day15 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホーラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p>	<p><3> 点滴 パクリタキセル 80 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day22 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホーラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 80 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day29 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホーラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 80 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day36 注射</p> <p><input type="checkbox"/>外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p>
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 平成 31年1月11日 申請医師： 石黒 保直
 診療科： 外科 癌腫： 乳がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040147	レジメン名： PTX療法(12週投与)
------	---------	---------------------

<p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day43 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day50 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day57 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day64 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p>	<p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day71 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day78 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p> <p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL</p> <p>1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A</p> <p>ホラミン注5mg(1mL) 1 A</p> <p>セシヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶</p> <p>☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴</p> <p>パクリタキセル 80 mg/m²</p> <p>ブドウ糖注 5%250mL **** 1 袋</p> <p>☆60分で点滴</p> <p>★フィルター付点滴セットにて投与</p>
---	--