

化学療法プロトコール

申請日： 令和 2年2月18日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 乳がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C041170	レジメン名： GEM+Tmab療法(2クール目)
1コース期間	3週	総コース数

備考：

・初回投与時infusion reactionに注意

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタビン	1200 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8
2	トラスツズマブ(ハーセプチン)	2 mg/kg		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1200 mg/m² セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 トラスツズマブ (ハーセプチン) 2 mg/kg 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆30分で点滴 フェウヤヨスイ 100mL 1 瓶 ★注射用水はトラスツズマブ溶解用</p> <p>day8 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1200 mg/m² セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 トラスツズマブ (ハーセプチン) 2 mg/kg 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆30分で点滴 フェウヤヨスイ 100mL 1 瓶 ★注射用水はトラスツズマブ溶解用</p> <p>day15 注射</p> <p><input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴</p>	<p>【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶</p> <p>セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 トラスツズマブ (ハーセプチン) 2 mg/kg 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆30分で点滴 フェウヤヨスイ 100mL 1 瓶 ★注射用水はトラスツズマブ溶解用</p>
---	---