化学療法プロトコール

申請日: 平成 26年11月7日 申請医師: 遠野 千尋

診療科: 外科 癌腫: 乳がん

実施区分: 入外共通

 管理番号
 C040040
 レジメン名: TC療法

 1コース期間 3週
 総コース数

備考

・術前・術後補助療法の場合は4コース。・間質性肺炎または肺線維症の有無の確認。・ドセタキセルは起壊死性抗がん剤なので血管外漏出注意。・投与中の過敏症反応の有無を確認。・投与後のドセタキセルによる浮腫に注意(ステロイドが有効)。

| 番号 | 薬剤名 | 基準投与量 | 投与量上限 | 規格 | 投与方法 | 投与スケジュール(day1等) |
|----|-------------------|-----------|-------|----|------|-----------------|
| 1 | ドセタキセル | 75 mg/m² | | 自動 | 点滴 | day1 |
| 2 | エンドキサン(シクロホスファミド) | 600 mg/m² | | 自動 | 点滴 | day1 |

備考:

ケモセーフ使用時、DTX(アルコールフリー製剤)は粘度が高いため、シリンジ内で希釈混和し混注すること

実施内容

day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉デカドロン錠4mg 朝1錠、昼1錠 2 錠 朝昼 食後30分2日 注射 口外来 化学療法実施 <1> 点滴 1 瓶 <2> 点滴 【H】【6.6mg】デキサート注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 【H】デキサート注射液 3.3mg/1mL グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 1 A 1 袋 → 1 5 分で点滴 〈3〉点滴 ドセタキセル(アルコールフリー製剤) 75 mg/m^2 生理食塩液 250mL 1 袋 ★/ftd-7使用時、シリンジ内希釈混和法で調整
☆ 6 0 分で点滴
<4> 点滴 エンドキサン(シクロホスファミド) $600 \, \underline{m} \, g/m^2$ セイショウ(生食) 【100mL】 ●● ☆30分で点滴 1 瓶 予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法