

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規  
診療科： 外科 癌腫： 胃がん  
実施区分： 入外共通

管理番号	C031500	レジメン名： ニボルマブ+CapeOX療法(CVポート用)(Cape:3600mg)
1コース期間	3週	総コース数

備考：  
カペシタビン：1日2回投与 14日間内服のち7日間休薬  
カペシタビン：BSA<1.36㎡:1200mg/回 1.36㎡≤BSA≤1.66㎡:1500mg/回 1.66㎡≤BSA≤1.96㎡:1800mg/回  
1.96㎡≤BSA:2100mg/回  
オプジーボ：間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オプジーボ	360 mg/body		自動	点滴	day1
2	オキサリプラチン	130 mg/㎡		自動	点滴	day1
3	カペシタビン	3600 mg/body		自動	内服	day1～day14

備考：  
カペシタビン：BSA<1.36㎡:1200mg/回 1.36㎡≤BSA≤1.66㎡:1500mg/回 1.66㎡≤BSA≤1.96㎡:1800mg/回  
1.96㎡≤BSA:2100mg/回

## 実施内容

<p>day1 処方 ＜内服＞ 臨時 ＜4mg＞ テキサドロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日 ＜内服＞ 臨時 カペシタビン 3600 mg/body 朝 夕 食後30分 14日 ＜外用＞ 臨時 ハルニトロン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本)(ヒルドイドソフト軟膏) 50g 1日2回 手、足</p> <p>注射 ＜1＞ 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 ＜2＞ 点滴 オプジーボ 360 mg/body セイヨク(生食) &lt;50mL&gt; ◆ 1瓶 ☆30分で点滴 ★0.2μmインラインフィルターを使用 ＜3＞ 点滴 クワンセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」 1袋 【H】 【6.6mg】 テキサド注射液 6.6mg/2mL 1瓶 ☆30分で点滴 ＜4＞ 点滴 オキサリプラチン 130 mg/㎡ ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴</p>	
--	--