

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規
診療科： 外科 癌腫： 胃がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C031401	レジメン名： ニボルマブ+SOX療法(末梢用)(TS-1:80mg)
1コース期間	3週	総コース数

備考：

エスワン:1日2回投与 14日間内服のうち7日間休薬
エスワン:BSA<1.25㎡:40mg/回 1.25㎡≤BSA≤1.5㎡:50mg/回 1.5㎡≤BSA:60mg/回
オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オプジーボ	360 mg/body		自動	点滴	day1
2	オキサリプラチン	130 mg/㎡		自動	点滴	day1
3	ティーエスワン	80 mg/body		自動	内服	day1～day14

備考：

エスワン:BSA<1.25㎡:40mg/回 1.25㎡≤BSA≤1.5㎡:50mg/回 1.5㎡≤BSA:60mg/回
オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 テキサドロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日 〈内服〉 臨時 ティーエスワン 80 mg/body 朝 夕 食後30分 14日</p> <p>注射 〈1〉 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 オプジーボ 360 mg/body セイヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ☆30分で点滴 ★0.2μmインラインフィルターを使用 〈3〉 点滴 ケラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HKJ」 1袋 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 ☆30分で点滴 〈4〉 点滴 オキサリプラチン 130 mg/㎡ 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ブドウ糖注 5% <<500mL>> 1袋 ☆2時間で点滴</p>	
---	--