

化学療法プロトコール

申請日： 平成 29年12月8日 申請医師： 箱崎 将規
 診療科： 外科 癌腫： 胃がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C020042	レジメン名： weekly nab-PTX療法
1コース期間	4週	総コース数

備考：
 ・特定生物由来製品のため、同意書(医師)と血漿分画製剤伝票記載(薬剤科)。・インラインフィルターは使用しないこと！
 ・アブラキサン投与後の末梢神経障害、脳神経麻痺、視力低下等の出現有無確認
 ・各コースday1に好中球1,500/mm3未満又は血小板数が $100,000/mm^3$ 未満であれば回復するまで投与延期。
 ・アブラキサン減量の目安: $260mg/m^2 \rightarrow 220mg/m^2 \rightarrow 180mg/m^2$

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	$100 mg/m^2$		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：
 ・特定生物由来製品のため、同意書(医師)と血漿分画製剤伝票記載(薬剤科)。
 ・インラインフィルターは使用しないこと！
 ・アブラキサン投与後の末梢神経障害、脳神経麻痺、視力低下等の有無確認。

実施内容

<p>day1 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) $100 mg/m^2$ セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★必要量を抜き取り、空の生食バッグに注入 ☆30分で点滴</p> <p>day8 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) $100 mg/m^2$ セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★必要量を抜きとり、空の生食バッグに注入 ★(禁止)インラインフィルター ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) $100 mg/m^2$ ★必要量を抜きとり、空の生食バッグに注入 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★(禁止)インラインフィルター ☆30分で点滴</p>	
--	--