

# 化学療法プロトコール

申請日： 平成 30年8月22日 申請医師： 石黒 保直  
診療科： 外科 癌腫： 胃がん  
実施区分： 入外共通

管理番号	CO20043	レジメン名： RAM+nab-PTX療法
1コース期間	4週	総コース数

**備考：**

- ・尿蛋白2g以上の場合には定量検査を実施し、2g/日以上3g/日未満であれば2g/日未満に低下するまで休薬し、減量して再開。尿蛋白3g/日以上であれば投与を中止。
- ・アブラキサン使用のため、血液製剤同意書・血漿分画製剤等請求伝票が必要。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	サイラムザ (ラムシルマブ)	8 mg/kg		自動	点滴	day1, day15
2	アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	100 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1, day8, day15

**備考：**

- ・サイラムザの投与速度は25mg/分を超えないこと。
- ・サイラムザの投与にあたっては、蛋白質透過型のフィルター(0.2μ)を使用し、他の薬剤と同じラインを使用しないこと。

**実施内容**

<p>day1 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 ホラミン注5mg (1mL) 1 A セリョク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 サイラムザ (ラムシルマブ) 8 mg/kg 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整：サイラムザ 使用分の生食を抜き ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>&lt;4&gt; 点滴 セリョク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ★5分で点滴</p> <p>&lt;5&gt; 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) 100 mg/m<sup>2</sup> セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★(禁止)インラインフィルター ☆30分で点滴 ★必要量を抜きとり、空の生食バッグに注入</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	<p>施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day15 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 ★プライミング・ウォッシュアウト用 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 ホラミン注5mg (1mL) 1 A セリョク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 サイラムザ (ラムシルマブ) 8 mg/kg 生理食塩液 250mL 1 袋 ★全量250mLに調整：サイラムザ 使用分の生食を抜き ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>&lt;4&gt; 点滴 セリョク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ★5分で点滴</p> <p>&lt;5&gt; 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) 100 mg/m<sup>2</sup> セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★(禁止)インラインフィルター ☆30分で点滴 ★必要量を抜きとり、空の生食バッグに注入</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>
<p>day8 注射</p> <p>&lt;1&gt; 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セリョク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) 100 mg/m<sup>2</sup> セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★(禁止)インラインフィルター ☆30分で点滴 ★必要量を抜きとり、空の生食バッグに注入</p> <p>予約</p>	