

化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年7月1日 申請医師： 箱崎 将規
診療科： 外科 癌腫： 胃がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C031600	レジメン名： ニボルマブ+mFOLFOX6療法(HER2陰性)
1コース期間	2週	総コース数

備考：
オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オプジーボ	240 mg/body		自動	点滴	day1
2	レボホリナート	200 mg/m ²		自動	点滴	day1
3	オキサリプラチン	85 mg/m ²		自動	点滴	day1
4	フルオロウラシル	400 mg/m ²		自動	点滴	day1
5	フルオロウラシル	2400 mg/m ²		自動	点滴	day1

備考：
オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 デキサメタゾン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 〈1〉 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>〈2〉 点滴 オプジーボ 240 mg/body セシヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ☆30分で点滴 ★0.2μmインラインフィルターを使用</p> <p>〈3〉 点滴 ゲラセトロン点滴静注パック 3mg/50mL [HK] 1袋 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>〈4〉 点滴 オキサリプラチン 85 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴</p> <p>〈5〉 点滴 レボホリナート 200 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ★オキサリプラチンと同時に2時間で点滴</p> <p>〈6〉 点滴 フルオロウラシル 400 mg/m² セシヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ★10分で点滴</p> <p>〈7〉 点滴 フルオロウラシル 2400 mg/m² セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆全量100mLに調整 ☆46時間・シユアーフューザー</p> <p>〈8〉 静注 生食注 【シツジ】 オツカ20mL◆ 1本</p>	
--	--