

化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年1月10日 申請医師： 箱崎 将規
 診療科： 外科 癌腫： 大腸がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C030052	レジメン名： Cape+Bev(Cape:1800mg)
1コース期間	3週	総コース数

備考：
 カペシタビン1日2回投与 Day1朝～Day15夕投与 14日間内服のち7日間休薬
 カペシタビン BSA<1.36㎡ 1200mg/回
 1.36㎡≤BSA<1.66㎡ 1500mg/回
 1.66㎡≤BSA<1.96㎡ 1800mg/回
 1.96㎡≤BSA 2100mg/回

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ペバシズマブ	7.5 mg/kg		自動	点滴	day1
2	カペシタビン	3600 mg/body		自動	内服	day1～day14

備考：
 カペシタビン1日2回投与 Day1朝～Day15夕投与 14日間内服のち7日間休薬
 カペシタビン BSA<1.36㎡ 1200mg/回
 1.36㎡≤BSA<1.66㎡ 1500mg/回
 1.66㎡≤BSA<1.96㎡ 1800

実施内容

<p>day1 処方 <内服> 臨時 カペシタビン 3600 mg/body 朝 夕 食後30分 14日 <外用> 臨時 ヌーリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) (ヒルト® 体ツツ軟膏) 50 g 1日2回 手、足 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 ペバシズマブ 7.5 mg/kg セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆初回90分・2回目60分・以降30分で点滴</p>	
---	--