## 化学療法プロトコール

申請日: 令和 5年5月19日 申請医師: 箱崎 将規

診療科: 外科 癌腫: 大腸がん

実施区分: 入外共通

| 管理番号   | C030080 | レジメン名: Cmab+CPT-11療法(1クール目) |       |
|--------|---------|-----------------------------|-------|
| 1コース期間 | 7週      |                             | 総コース数 |

## 備考:

・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミノマイシン、保湿剤などを処方する。

| 番号 | 薬剤名             | 基準投与量              | 投与量上限 | 規格 | 投与方法 | 投与スケジュール(day1等)                            |
|----|-----------------|--------------------|-------|----|------|--|
| 1  | アービタックス(セツキシマブ) | 400 mg/m²          |       | 自動 | 点滴   | day1                                       |
| 2  | イリノテカン          | 150 mg/m²          |       | 自動 | 点滴   | day1, day15, day29                         |
| 3  | アービタックス(セツキシマブ) | 250 mg/ <b>m</b> ² |       | 自動 |      | day8, day15, day22,<br>day29, day36, day43 |

備考:

| 実施内容   |  |
|--|--|
| day1   | 【H】デキサート注射液 3.3mg/1mL 1 A<br>【H】【1.65mg】デキサート注射液 1.65mg/0.5<br>mL                            |
| t/ショウ(生食)【100mL】 ●● 1 瓶<br>☆プライミング・ウォッシュアウト用<br><2> 点滴   | 1 A  |
| n°ロ/セトロン点滴静注n゙ッグ0.75mg/50mL「タイホウ」<br>1 袋   | アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m <sup>3</sup><br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜去     |
| 7ロカリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶<br>【H】デキサート注射液 3.3mg/1mL 1 A<br>【H】【1.65mg】デキサート注射液 1.65mg/0.5           | ☆ 6 0 分で点滴<br><4> 点滴   |
| mL<br>1 A<br>☆ 3 O 分で点滴  | セイショウ(生食) <50mL>◆ 1 瓶<br>☆60分で点滴<br><5> 点滴   |
|  | イリノテカン 150 mg/㎡<br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>☆90分で点滴  |
| ☆ 2 時間で点滴<br><4> 点滴  | day22<br>注射  |
| tイショク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶<br>☆ 6 0 分で点滴<br>〈5〉点滴  | <1> 点滴<br>セイショク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶<br>☆プライミング・ウォッシュアウト用                                      |
| イリノテカン 150 mg/m <sup>2</sup><br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>☆90分で点滴                                       | 〈2〉点滴<br>アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m²<br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜去        |
| day8<br>注射<br><1>点滴  | ☆60分で点滴<br><3>点滴<br>セイショク(生食) <50mL>◆ 1 瓶  |
| セイショク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶<br>☆プライミング・ウォッシュアウト用  | ☆60分で点滴  |
| <2> 点滴<br>アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m<br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜去<br>☆60分で点滴 | day29<br>  注射<br>  <1> 点滴<br>  セイショウ(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶<br>  ☆プライミング・ウォッシュアウト用               |
| <3> 点滴<br>セイショク(生食) <50mL>◆ 1 瓶<br>☆60分で点滴   | <2> 点滴<br>パロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」<br>1 袋   |
| day15  | 7ロカリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶<br>【H】デキサート注射液 3.3mg/1mL 1 A<br>【H】【1.65mg】デキサート注射液 1.65mg/0.5<br>mL |
|  | 1 A  |
| ハ°ロノセトロン点滴静注ハ`ック°0.75mg/50mL「タイホウ」<br>1 袋<br>7ロカリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶                             | デービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m <sup>2</sup><br>生理食塩液 250mL 1 袋<br>★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜去     |

## 化学療法プロトコール

申請日: 令和 5年5月19日 申請医師: 箱崎 将規

診療科: 外科 癌腫: 大腸がん

実施区分: 入外共通

管理番号 C030080

レジメン名: Cmab+CPT-11療法(1クール目)

☆60分で点滴 1 瓶 (5) 点滴イリノテカン生理食塩液 250mL 150 mg/㎡ 1 袋 ☆90分で点滴 day36 注射 〈1〉点滴  $250 \text{ mg/m}^2$ ☆60分で点滴 1 瓶 day43 注射 〈1〉点滴 〈1〉点滴 セイショク(生食)【100mL】●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉点滴 アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/ 生理食塩液 250mL ★全量250mLに調整:7-ビタックス使用分の生食を抜去 ★6 0 ハベム は流  $250~{\rm mg\,g/m^2}$ ☆60分で点滴 1 瓶