

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C030060	レジメン名： Cmab+FOLFIRI(2クール目以降)
1コース期間	2週	総コース数

備考：

・リネカンによる早発性及び遅発性下痢に注意・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミマイシン、保湿剤などを処方する。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アービタックス(セツキシマブ)	250 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8
2	イリノテカン	150 mg/m ²		自動	点滴	day1
3	レボホリナート	200 mg/m ²		自動	点滴	day1
4	5-FU	400 mg/m ²		自動	点滴	day1
5	5-FU	2400 mg/m ²		自動	点滴	day1

備考：

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 デキタ[®]錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 〈1〉 点滴 セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>〈2〉 点滴 パロセトロン点滴静注パッ[®] 0.75mg/50mL「タイ林」 1袋 【H】 【6.6mg】 デキタ[®]注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキタ[®]注射液 3.3mg/1mL 1A ホラミン注5mg(1mL) 1A ☆15分で点滴</p> <p>〈3〉 点滴 アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ☆60分で点滴 ★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜</p> <p>去 〈4〉 点滴 セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆60分で点滴</p> <p>〈5〉 点滴 イリノテカン 150 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ☆90分で点滴 ★レボホリナートと同時に点滴</p> <p>〈6〉 点滴 レボホリナート 200 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ☆2時間で点滴 ★イリノテカンと同時に点滴</p> <p>〈7〉 点滴 フルオロウラシル 400 mg/m² セツヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ★10分で点滴</p> <p>〈8〉 点滴 フルオロウラシル 2400 mg/m² セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆全量1000mLに調整</p>	<p>☆46時間・シュアーフューザー 〈9〉 静注 生食注【シリンジ】 オツク20mL◆ 1本</p> <p>day8 注射 〈1〉 点滴 セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>〈2〉 点滴 【H】 【6.6mg】 デキタ[®]注射液 6.6mg/2mL 1瓶 ホラミン注5mg(1mL) 1A セツヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ☆15分で点滴</p> <p>〈3〉 点滴 アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ☆60分で点滴 ★全量250mLに調整:アービタックス使用分の生食を抜</p> <p>去 〈4〉 点滴 セツヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆60分で点滴</p>
--	--