

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C031300	レジメン名： IRIS+Bev療法(TS-1 80mg)
1コース期間	3週	総コース数

備考：

TS-1投与基準:BSA<1.25㎡…40mg/回1.25㎡≤BSA<1.5㎡…50mg/回1.5㎡≤BSA…60mg/回・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意。・各クール開始前、及び投与期間中は2週間に1回以上血液検査等を行う。・前コースでGrade3以上の血液学的毒性orGrade2以上の非血液学的毒性が出現した場合は次コースでTS-1を1段階減量。  
ペバシズマブ投与初回の投与時反応に注意。尿蛋白2+以上でペバシズマブ休薬。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ペバシズマブ	7.5 mg/kg		自動	点滴	day1
2	イリノテカン	150 mg/㎡		自動	点滴	day1
3	ティーエスワン	80 mg/body		手動	内服	day1～day14

備考：

実施内容

<p>day1 処方 &lt;内服&gt; 臨時 &lt;4mg&gt; テキサト錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 朝 昼 食後30分 2日 &lt;内服&gt; 臨時 ティーエスワン 80 mg/body 朝 夕 食後30分 14日</p> <p>注射 &lt;1&gt; 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴 ペバシズマブ 7.5 mg/kg セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆初回90分・2回目60分・以降30分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイク」 1袋 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴</p> <p>&lt;4&gt; 点滴 イリノテカン 150 mg/㎡ 生理食塩液 250mL 1袋 ☆90分で点滴</p>	
--	--