

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規
診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C050012	レジメン名： TS-1+GEM療法(TS-1:120mg)
1コース期間	4週	総コース数

備考：
TS-1投与基準：BSA<1.25㎡・・・40mg/回1.25㎡≤BSA<1.5㎡・・・50mg/回1.5㎡≤BSA・・・60mg/回
・前コースでGrade3以上の血液学的毒性orGrade2以上の非血液学的毒性が出現した場合は次コースでS-1を1段階減量。・ゲムシタピンの開始直後の血管痛に注意する。もし、訴えがあった場合には温めるなど試みる。・ゲムシタピンの投与時間は30分で。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day15
2	ティーエスワン	120 mg/body		手動	内服	day1～day14

備考：

実施内容

<p>day1 処方 ＜内服＞ 臨時 ティーエスワン 120 mg/body 朝 夕 食後30分 14日</p> <p>注射 ＜1＞ 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>＜2＞ 点滴 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 セリョク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ☆15分で点滴</p> <p>＜3＞ 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day15 注射 ＜1＞ 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>＜2＞ 点滴 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 セリョク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ☆15分で点滴</p> <p>＜3＞ 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	
--	--