

化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年12月18日 申請医師： 遠野 千尋
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C050015	レジメン名： nab-PTX+GEM療法
1コース期間	4週	総コース数

備考：

・特定生物由来製品のため、同意書(医師)と血漿分画製剤伝票記載(薬剤科)。
 ・アブラキサン投与後の末梢神経障害、脳神経麻痺、視力低下等の出現有無確認
 ・各コースday1に好中球1,500/mm³未満又は血小板数が100,000/mm³未満であれば回復するまで投与延期。day8、15に関しては適正使用の目安を参照。
 ・アブラキサン減量の目安：125mg/m²→100mg/m²→75mg/m²・ゲムシタピンの開始直後の血管痛に注意する。もし、訴えがあった場合には温めるなど試みる。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	125 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：

・インラインフィルターは使用しないこと
 ・ゲムシタピンの投与時間は30分で

実施内容

<p>day1 処方 <内服> 臨時 <4mg> デカドロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 ゲラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」 1袋 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 125 mg/m² 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	<p><3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 125 mg/m² 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>
<p>day15 処方 <内服> 臨時 <4mg> デカドロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 ゲラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」 1袋 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 125 mg/m² 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	<p><3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 125 mg/m² 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>
<p>day8 処方 <内服> 臨時 <4mg> デカドロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 ゲラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」 1袋 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴</p>	<p><3> 点滴 アブラキサン (アルブミン懸濁型パクリタキセル) セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 125 mg/m² 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p><4> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>