

化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年2月3日

申請医師： 石井 修平

診療科： 泌尿器科

癌腫： 尿路上皮がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C110100	レジメン名： GEM+CDDP(尿路上皮がん)
1コース期間	4週	総コース数

備考：

- ・ゲムシタピンの開始直後の血管痛に注意する。もし、訴えがあった場合には温めるなど試みる。ゲムシタピンの投与時間は30分。
- ・シスプラチン：腎障害時の投与変更例Ccr 60~46(25%減量) 45~31(50%減量) 30≧(使用中止)

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	シスプラチン	70 mg/m ²		自動	点滴	day2

備考：

実施内容

day1 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m ² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴 day2 処方 <内服> 臨時 <4mg> デキト錠4mg 2 錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 《500mL》 1 袋 ☆2時間で点滴 <2> 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイバ」 1 袋 アオリス点滴静注235mg/10mL 1 瓶 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A ☆30分で点滴 <3> 点滴 セイヨク(生食) 《500mL》 1 袋 硫酸Mg補正液2.46g/20mL 0.4 管 ☆2時間で点滴 <4> 点滴 アロピド注20mg「NIG」(ラジックス) 1 A セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <5> 点滴 シスプラチン 70 mg/m ² セイヨク(生食) 《500mL》 1 袋 ☆2時間で点滴 ★シスプラチンの分、生食抜き取り <6> 点滴 セイヨク(生食) 《500mL》 1 袋 ☆2時間で点滴 <7> 点滴	セイヨク(生食) 《500mL》 1 袋 ☆2時間で点滴 day8 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m ² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴 day15 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m ² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴
---	--