

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年3月15日

申請医師： 石井 修平

診療科： 泌尿器科

癌腫： 尿路上皮がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C110106	レジメン名： エンホルツマブ・ベドチン(パドセブ)療法
1コース期間	4週	総コース数

備考：

PD-1/PD-L1阻害剤の治療歴があることを必ず確認すること
1回量として125mgを超えないこと
皮膚障害、高血糖、末梢神経障害等の副作用に注意すること

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パドセブ	1.25 mg/kg		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：

1回量として125mgを超えないこと
皮膚障害、高血糖、末梢神経障害等の副作用に注意すること

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パドセブ 1.25 mg/kg セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 フェウシャヨクスイ 20mL 1 瓶 ★注射用水はパドセブ溶解用 ☆30分で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パドセブ 1.25 mg/kg セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 フェウシャヨクスイ 20mL 1 瓶 ★注射用水はパドセブ溶解用 ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パドセブ 1.25 mg/kg セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 フェウシャヨクスイ 20mL 1 瓶 ★注射用水はパドセブ溶解用 ☆30分で点滴</p>	
--	--